

nieuwsbrief



Dierenkliniek Heythuysen

Kloosterstraat 42, 6093 CX Heythuysen
www.dierenkliniekheythuysen.nl
 Telefoon: 0475-496262

Openingstijden:

ma tm vr 9.00-12.15 uur en 13.15-18.15 uur



STERKLINIEK
 dierenartsen

In deze uitgave o.a.:

■ Bescherm uw konijn!

■ De maagkanteling

■ Een twaalfponder!

Gezondheidscontroles: logisch!

In plaats van nieuwe mogelijkheden van diagnostiek, gaan we dit keer iets bespreken wat niet spectaculair lijkt, maar wel heel belangrijk is: de jaarlijkse gezondheidscontrole van uw kat of hond. Want behalve zieke dieren behandelen, is het zeker zo belangrijk om ziekten te voorkomen of vroegtijdig op te sporen.

In de 2e Nieuwsbrief van 2008 hebben we beschreven hoe we uw pup begeleiden in de eerste levensmaanden. Maar ook daarna blijven regelmatige gezondheidscontroles belangrijk. Elk jaar lijkt dan misschien in eerste instantie wat veel, maar in aanmerking nemend dat één levensjaar van een hond of kat (mede afhankelijk van grootte en ras) overeenkomt met 6-10 mensenjaren, is dit ten onrechte.

Zeker omdat een hond of kat niet kan zeggen als er iets niet helemaal goed is, en je dit dus als eigenaar soms pas in een laat stadium merkt als bijv. de eetlust vermindert of het gedrag verandert. Heel bewust en systematisch als dierenarts een controle uitvoeren geeft veel meer kans om in een vroeg stadium een afwijking op te sporen. (Dit geldt ook voor onze eigen dieren:

het blijkt een valkuil om te denken dat ons niets ontgaat omdat we deze elke dag zien !)

Het eerste wat we doen is uw dier wegen, immers zowel overgewicht als een te laag gewicht vraagt om aandacht. Het meten op de weegschaal levert voor een eigenaar vaak verrassende informatie op, en als dit elk jaar gebeurt kun je ook vaststellen of het gewichtsverloop goed is. Daarna beoordelen we algemene zaken als gedrag en houding van uw dier. En vervolgens gaan we de verschillende organen beoordelen: huid, beharing, lymfeknopen, ademhaling, hart, neus, bek, ogen en oren, melkklieren; en we bevoelen de buik, rug, benen en nagels. Door dit systematisch te doen kunnen we een goed oordeel vormen. Indien hier iets afwijkends gevonden wordt, of u hebt zelf iets afwijkends gezien zoals verminderde eetlust of opvallend veel drinken, kan het verstandig zijn om een nader onderzoek te doen, om zo vast te stellen of er inderdaad iets aan de hand is.

Daarnaast zullen we u ook attenderen op ontworming (het is een misvatting om te denken dat je alleen hoeft te ontwormen als je wormen

in de ontlasting hebt gezien: Europese richtlijnen adviseren 4x per jaar ontworming, met name ook voor de gezondheid van mensen) en uw dier indien nodig een vaccinatie geven. Dat dit hele consult ondertussen nog steeds vaak de naam 'jaarlijkse vaccinatie' meekrijgt is dus geen goede omschrijving, maar gemakshalve laten we dat maar zo. Dat een ouder dier geen vaccinaties meer nodig zou hebben is daarbij een regelmatig gehoorde misvatting; helaas blijken eigenaren die dat denken dan ook de gezondheidscontroles te vergeten, en dat is – zoals inmiddels duidelijk zal zijn – zeker bij oudere dieren niet verstandig en een gemiste kans.

Nieuwe assistente

Per 1 januari jl. heeft Marcia van Geenen ons team verlaten (ze is samen met haar vriend een eigen bedrijf gestart). Maaike Baten is onze nieuwe enthousiaste assistente op donderdag en vrijdag.

LENTE

Het is gek om, op het moment dat ik deze column schrijf, te bedenken dat de lente al niet zo heel ver weg meer is. Buiten in de tuin doen de vogels wanhopige pogingen in de bevroren grond voedsel te vinden. Maar ook zie ik duiven al weer toenaderingspogingen doen, ze zijn er vroeg bij!


In januari kijken de meeste klinieken terug op de ontwikkelingen van het laatste jaar. Eén van de dingen die er bij ons uitsprong was de afname van het aantal castraties bij de reuen. De voornaamste reden om reuen te castreren is het bestrijden van een chronisch ontstoken voorhuid met de bekende gele druppels als gevolg. Maar ook ongewenste seksuele activiteit kan een reden zijn. De statistieken konden snel verklaard worden door het succes van nieuwe kleine implantaatjes die middels een injectie onder de huid worden aangebracht. De hierin aanwezige hormonen zorgen voor een "niet-bloedige" castratie van de reu: het druppelen houdt op, ze zijn niet meer geïnteresseerd in teefjes en in een aantal gevallen zien we een wat evenwichtiger gedrag. Bij slechte eters kan het ook nog een handje helpen. Wel moet er gelet worden op de voergift want de energiebalans kan ook een beetje veranderen. Vooral de mannelijke baasjes lijken erg blij met deze behandeling want na verloop van tijd keert alles weer naar het oude terug als je de behandeling niet herhaalt. Kortom, het is dus niet definitief en kan prima als tijdelijke maatregel fungeren.

Nu het middel wat langer op de markt is komen er ervaringen met anderen diersoorten naar boven.

Zo is het implantaat ook uitstekend geschikt om zowel bij mannelijke als vrouwelijke fretten de geslachtsdrift te stoppen. Misschien is bovenstaande iets om eens met uw dierenarts te bespreken voordat de dieren definitief de lentekriebels krijgen...



Bescherm uw konijn!



Het is al weer maart. De dagen worden langer en het voorjaar staat voor de deur. Helaas is dit ook de periode dat bij het konijn de ziektes Myxomatose en het Viraal Hemorrhagisch Syndroom de kop opsteken. Tijd voor tekst en uitleg.

Myxomatose

Elk jaar sterven er wilde en tamme konijnen aan de gevreesde Myxomatose. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een poxvirus (pokkenvirus). Het wordt op verschillende manieren verspreid, maar de meest voorkomende manier is door overdracht via stekende insecten, zoals muggen, bepaalde vliegen en vlooien. Ook direct contact tussen uw konijn en een konijn met Myxomatose kan uw dier besmetten.

De ziekteverschijnselen bij een geïnfecteerd konijn ontstaan ongeveer 1 week na het eerste contact met het virus. Deze verschijnselen kunnen wisselen per konijn. De huid vertoont dikke knobbels (myxomen) ter hoogte van de oren, neus, oogleden en het perineum (regio tussen anus en geslachtsopening). Daarna kan er een etterende oog- en neusuitvloeiing ontstaan en de oogleden kunnen gaan vastplakken. Een bijkomende bacterie kan andere bijkomende verschijnselen geven. Uiteindelijk sterft het konijn. Er zijn ook konijnen die sterven zonder voorafgaande verschijnselen.

De dierenarts zal de diagnose stellen op basis van de verschijnselen van het konijn. Soms zal er verder onderzoek nodig zijn. Aan de hand van de toestand van het konijn zal er besloten worden tot behandeling ofwel om het dier te laten inslapen. Dit laatste gebeurt als er echt geen hoop meer op genezing is.

Zoals voor zoveel geldt, is ook hier aan de orde: voorkómen is beter dan genezen. Voorkom dat uw dier in contact komt met het virus. Geef vlooien, vliegen en muggen geen kans. Zorg voor fijnmazig gaas in het hok in de periode dat muggen, vliegen en vlooien actief zijn (voornamelijk in de lente, zomer en herfst). Behandel uw konijn eventueel tegen vlooien met een veilig middel (geen Frontline®, dit kan dodelijk zijn voor een konijn). Laat uw konijn minimaal 2 keer per jaar vaccineren tegen Myxomatose. Na vaccinatie kan er een klein bultje ontstaan in de huid, meestal verdwijnt dit spontaan. Dus houdt de vaccinatiedata bij uw dierenarts goed in de gaten!

Het viraal hemorrhagisch syndroom (VHS)

Ook deze ziekte wordt veroorzaakt door een virus, een Calicivirus. Het virus wordt uitgescheiden in de ontlasting, urine en in het speeksel van geïnfecteerde dieren. Een ander konijn wordt geïnfecteerd bij inname hiervan. Voornamelijk konijnen ouder dan 6 weken zijn gevoelig voor dit virus. Meestal leidt infectie tot sterfte zonder voorafgaande verschijnselen. Soms is er sprake van niet willen eten, kortstondige hoge koorts en zenuwverschijnselen. Ook bloederige neusuitvloeiing is mogelijk. Bijna altijd leidt infectie met deze ziekte tot sterfte. Zorg dat uw dier niet in contact kan komen met het virus. Geef geen groenvoer dat in contact kan zijn geweest met wilde konijnen. Laat uw konijn één keer per jaar vaccineren tegen het viraal hemorrhagisch syndroom.

Neem contact op met uw dierenarts voor meer informatie over beide ziektes. En hou de vaccinatiedata scherp in de gaten!

Ook honden hebben recht op een stralende glimlach!



Heel veel honden hebben last van gebitsproblemen die te maken hebben met de vorming van tandplak. Tandplak is een laag die zich vormt op de tanden en bestaat uit o.a. water, voedselresten, mineralen uit het speeksel en bacteriën. Mensen vormen ook makkelijk tandplak, maar door dagelijks poetsen en het gebruik van tandenstokers of flosdraad houden wij dat meestal netjes bij. Bij honden wil dat regelmatig poetsen er nog wel eens bij inschieten, om over het gebruik van tandenstokers en flosdraad maar helemaal niet te spreken...

Parodontitis veroorzaakt zonder tijdig ingrijpen steeds ernstigere symptomen zoals pijn, stank uit de bek, moeite met eten, bloedingen en pusvorming, en de schade die erdoor ontstaat is onomkeerbaar. Bovendien kunnen elders in het lichaam ook symptomen optreden door verspreiding van ziekmakende bacteriën vanuit de mondholte.

te verwijderen zodat er geen onomkeerbare veranderingen ontstaan. Professionele schoonmaak van het gebit is uiteraard ook essentieel wanneer toch parodontitis is ontstaan, maar ter ondersteuning van de behandeling zijn in ernstigere gevallen ook antibiotica nodig. Omdat het ingeven van tabletten niet altijd eenvoudig is, zeker niet bij een hond die toch al last heeft van pijn en ontsteking in de bek is het goed om te weten dat dierenartsen nu ook de beschikking hebben over een unieke antibioticuminjectie die 14 dagen werkt. Een bijzonder gemakkelijke en effectieve manier om zonder tablettenkuur de bij parodontitis optredende bacteriële infecties te helpen aanpakken – vraag uw dierenarts er naar!

Voorkomen is beter dan genezen, dus zou het ideaal zijn als ook hondentanden dagelijks werden gepeetst. Maar in de praktijk komt dat er lang niet altijd van dus is het extra belangrijk dat het gebit van een hond van jongs af aan met regelmaat wordt gecontroleerd door de dierenarts. Er kan dan tijdig worden ingegrepen door tandplak en tandsteen

Tandplak – en later tandsteen – kan zich overal vormen waar de reiniging niet voldoende is, maar ontstaat vooral gemakkelijk langs het tandvlees. Ten gevolge daarvan kan zich een ontsteking ontwikkelen van het tandvlees (gingivitis). Dit proces gaat gepaard met het ontstaan van meer ruimte tussen tandvlees en tand of kies, we spreken dan van de vorming van zogenaamde pockets. Deze bieden een ideale omgeving voor de groei van bacteriën waardoor, als niet tijdig wordt ingegrepen, de infectie zich steeds verder en dieper kan gaan uitbreiden.

Een dergelijke uitgebreidere ontsteking heet parodontitis en leidt na verloop van tijd tot weefsel- en botafbraak en het terugtrekken van het tandvlees waardoor de wortels bloot komen te liggen. Uiteindelijk kunnen tanden en kiezen zoveel stevigheid in de kaak verliezen dat ze los komen te zitten.

Parodontitis bij honden Een chronische progressieve ziekte



VROEGE STADIA

Tandplak en tandsteen

DUIDELIJKE SYMPTOMEN

Tandvleesontsteking

ERNSTIGE SYMPTOMEN

Weefsel- en botafbraak

ERNSTIGE SYMPTOMEN

Verlies van tanden

De maagkanteling

De maagkanteling is een aandoening van het maag-darmkanaal bij de hond die bij niet-tijdige behandeling leidt tot de dood.

Omdat behandeling vaak te laat komt en vanwege het feit dat er vaak complicaties optreden die alsnog tot de dood kunnen leiden is preventie van deze aandoening eigenlijk van levensbelang.

Door verschillende oorzaken kan de maag gaan draaien in de buikholte. Het holle orgaan maakt als het ware een slag om haar as en daarmee wordt aan de voorzijde de toegang (slokdam) dichtgedraaid en aan de achterzijde de uitgang (twaalfvingerige darm) eveneens. Deze afwijkende ligging van de maag wordt een maagkanteling genoemd.

Bij kleine honden is de aandoening zeldzaam, grote rassen zijn er veel gevoeliger voor. Het zijn voornamelijk honden van middelbare leeftijd en ouder die het grootse risico lopen de aandoening te krijgen.

Vaak worden de dieren onrustig, kwijlen kan optreden en op een gegeven moment zal de hond proberen te braken. Kenmerkend is dat bij dat braken alleen maar slijm wordt geproduceerd en geen maaginhoud. Aan de linkerkant van de hond is net achter de laatste rib duidelijk de opgezette maag waarneembaar als een dikke bult.

Uiteindelijk raakt het dier in shock, zal gaan liggen en steeds minder attent worden terwijl ademhaling en pols toenemen. Zonder spoedige deskundige hulp loopt het dan snel desastreus af.

Wat kunt u doen om een maagkanteling te voorkomen?

- Laat de hond na het eten minstens een uur met rust, dit stimuleert de maaglediging en voorkomt dat de maag door plotselinge bewegingen een slag om haar as kan maken.
- Verdeel het dagrantsoen in minstens 3 verschillende porties zodat wederom de maag snel ledigt.
- Kies een geschikt en kwalitatief goed voer voor uw hond (vraag uw sterkliniek om advies!)
- Voorkom als het kan: koud zeewater drinken, ijs/sneeuw eten, koud water uit de tuinslang drinken, het eten van vreemde voorwerpen en schrokkerig eten.

De maagkanteling is echt een spoedsituatie, zorg dus in voorkomende gevallen dat uw hond met spoed naar een kliniek kan waar men op dat moment in staat is om de aandoening te behandelen c.q. te opereren.

De operatie en eventuele voorbehandeling vraagt veel menskracht en tijd. De behandeling is daarom ook knap prijzig en 's nachts of in het weekend kunnen de prijzen fors oplopen en rekeningen van € 1.200,00 - € 2.000,00 zijn geen uitzondering. Een goede reden om uw hond te verzekeren voor ziektekosten, dat scheelt u in ieder geval de financiële ellende en dan zijn er ten minste geen beperkingen voor een optimale behandeling.

Het konijn neemt een steeds belangrijkere plaats in onder onze huisdieren. De schattingen spreken van circa 600.000 konijnen die als huisdier liefdevol verzorgd worden.

Net zoals honden en katten kunnen ook konijnen verschillende ziekten en aandoeningen krijgen. In de praktijk blijkt dat behandelingen vaak laat worden ingezet omdat eigenaren niet snel genoeg de symptomen herkennen.

Wij zien het konijn als volwaardig huisdier en willen graag met voorlichting de levenskwaliteit van het dier verhogen. Daarom beginnen we met een makkelijk te herkennen beeld: het konijn met een scheef gehouden kop. De aangedane dieren kunnen ook dronkemansgang vertonen en zelfs omvallen of erg gaan trillen. De oorzaak is een parasiet die een hersenvliesontsteking veroorzaakt. Hierdoor kunnen de hersenen niet meer goed functioneren en verliest het dier de controle over een aantal zaken. De parasiet heeft als officiële naam: Encephalitozoon cuniculi (E.C.). Mensen met een verlaagde weerstand zouden ook gevoelig voor deze parasiet kunnen zijn. Al met al zaak dus om bij een konijn met een scheve kopstand snel onderzoek te laten doen door uw dierenarts.

Naast de parasiet E.C. kan bijvoorbeeld een middenoorontsteking ook deze symptomen veroorzaken dus dat moet goed uitgezocht worden. Staat eenmaal de diagnose vast dan is er een behandeling mogelijk maar de genezing kan wel enkele weken vergen. Ook als het konijn geneest kan het zijn dat het scheve kopje blijft, maar na enige tijd is het dier hier aan gewend en kan het verder normaal functioneren zonder pijn, eetproblemen of andere narigheid.

In de zomer kan het konijn bedreigd worden door vliegenmaden. Vliegen leggen dan eitjes in de vacht bij het konijn, zeker als deze wat restanten ontlasting in de vacht heeft. De maden kunnen verschrikkelijke gevolgen veroorzaken bij het konijn. Houd de achterzijde van het konijn goed in de gaten en vraag uw dierenarts bij diarree om advies inzake de voeding. Rear Guard is een middel dat de vliegen kan weghouden en wat u kunt aanbrengen op de vacht van uw konijn.



**STERKLINIEK**
dierenartsen

Colofon

Redactie

Drs. I.E. van Alten, dierenarts

Drs. B.J. Carrière, dierenarts

E-mail: info@sterkliniek.nl

De nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar en is een uitgave van Sterkliniek Dierenartsen.

Een twaalfponder!

Mijn collega Bernadette liep in de laatste dagen voor haar zwangerschapsverlof. Haar subtiel gegroeide buik hinderde haar steeds meer in de dagelijkse werkzaamheden. Ook de onrustige nachten begonnen hun tol te eisen. De bezoeken aan verloskundigen en zwangerschapsgym slokten eveneens onevenredig veel tijd op.

En toen presenteerde zich een lieve, bijna tienjarige Duitse Herder met een dikke buik, maar zonder klachten. In het pension waar ze de afgelopen week verbleef was haar volle buik opgevallen en daar hadden ze de eigenaren op gewezen. Meteen na thuiskomst maakten ze een afspraak bij ons. Ik constateerde een bizar dikke en stevige buik, die geheel gevuld leek met een groot proces. Ons ultramoderne echo-apparaat kon amper door de

massa heendringen. Op de digitale röntgenopname bleek de buik van voor tot achter uit een grijze schaduw te bestaan. Na overleg met de zeer bezorgde eigenaren werd toch besloten tot een buikoperatie.

Samen met de hoogzwangere Bernadette begon ik aan de ingreep. De snee van acht centimeter moest al snel worden vergroot tot vijftien en daarna tot dik twintig centimeter! Een keiharde waanzinnig grote milttumor zat muurvast in de buik. We stonden te hijgen en te puffen. De assistentes dekten onze voorhoofden met natte doekjes. De tumor bewoog geen millimeter. Ik dacht al aan opgeven, maar Bernadette leverde nog een ultieme krachtsinspanning. Ze slaakte een oerkreet en omvatte het megagezwel met beide handen: het bewoog! Ik knipte de wondrand in

en plots lag er een enorme weefselmassa buiten de buik. Het ongeloof spatte van alle gezichten. In ultiem teamwork bonden we alle bloedvaten af en even later lag het ding op de weegschaal: 6,2 kilo! Dit kon niet waar zijn. Samen hechtten we de gigantische buikwond dicht en toen begon de spannendste tijd: zou ze de postoperatieve periode overleven? Wat voor soort gezwel hebben we verwijderd?

En alle vragen werden binnen 1 week gunstig beantwoord. Op kerstavond kwam de pathologieuitslag binnen: het was een volkomen goedaardig proces! De feestdagen hadden niet mooier kunnen beginnen. En Bernadette had haar eerste bevalling al achter de rug.

Drs. L. Kamps, Sterkliniek Dierenartsen Hillegom

Nieuws van Sterkliniek Dierenartsen

Actief op het web

Sterkliniek dierenartsen beschikt ook over een eigen website: www.sterkliniek.nl

Hier treft u digitaal onze laatste nieuwsbrieven aan en regelmatig zijn hier interessante brochures te downloaden. Op deze webpagina treft u in ieder geval de allerlaatste ontwikkelingen aan van onze organisatie!

'Uw mening telt!' het is een veelgehoorde kreet, maar is het ook de waarheid?

Bij Sterkliniek Dierenartsen telt uw mening inderdaad! Wij voeren continu tevredenheidsonderzoek uit onder onze klanten en publiceren de resultaten via dit onderzoeksplatform.

Deze onderzoeken leiden continu tot het identificeren van verbetermogelijkheden en zijn het ultieme middel ter bewaking van de kwaliteit. Wilt u uw mening geven? Kijk dan eens op: www.sterkliniek.tevreden.nl

Verzeker uw hond of kat van de beste medische zorg met de Proteq Dier & Zorg Verzekering

De Proteq Dier en Zorg Verzekering is een ongevallenen ziektekostenverzekering voor honden en katten.

Maak het meteen in orde
www.proteq.nl

